

- Aire sur la lys 03 21 39 26 90
 Longuenesse 03 21 39 92 92
 Lumbres 03 21 95 31 15

Prélèvement ORL et conjonctival

Pour assurer la **qualité et la fiabilité des résultats**, il est indispensable de respecter les instructions de recueil, de conservation et de compléter les paragraphes « Contexte » et « Renseignements cliniques ».

Instructions de prélèvement

Quand ? A distance de tout traitement antibiotique ou antiseptique local ou général (sauf avis médical contraire)

Comment ?

- **Pharynx** : Utiliser un abaisse-langue pour dégager le pharynx et éviter le contact salivaire.
Demander au patient d'émettre le son « AAH » pour diminuer le reflex nauséux.
Écouvillonner la ou les amygdales atteintes ou, en leur absence, les piliers du voile du palais.
- **Bucco-lingual** : Ulcérations ou exsudat : prélever à ce niveau
Recherche de candida : prélever au niveau de la langue, du palais et de la face interne des joues
- **Oreille** : Eliminer les débris et croûtes présents dans le conduit auditif à l'aide d'un premier écouvillon humidifié avec de l'eau stérile afin de limiter la contamination par les bactéries commensales.
Recueillir les sécrétions avec le deuxième écouvillon tige fine
- **Nasal** : Réaliser un écouvillonnage des deux narines (tiers inférieur) avec le même écouvillon
- **Conjonctival** : Prélèvement avant la toilette faciale et en dehors de l'utilisation de produits de maquillage
Frotter au niveau de la conjonctive et des sécrétions purulentes visibles (angle interne de l'œil) en fonction de l'aspect des lésions. Prélever un écouvillon par œil.
Dans le cas d'une blépharite, prélever à la pince les cils et les croûtes et les mettre en pot stérile.
Pour une recherche de Chlamydiae, frotter les lésions apparentes avec un écouvillon « Cobas PCR Female »
- Replacer l'écouvillon dans son étui et fermer hermétiquement
- **IDENTIFIER LES TUBES**
- Replacer les écouvillons dans la poche et fermer après avoir enlevé la bande autocollante
- **COMPLÉTER CORRECTEMENT CETTE FICHE**
- Placer cette fiche et l'ordonnance dans la poche extérieure du sachet



Conservation : Apporter rapidement au laboratoire ou sinon conserver à t° ambiante au maximum 48h.

Contexte

- **Date et Heure de prélèvement (obligatoire)** : Le _____ à _____ H par : _____

- Localisation du prélèvement : Oreille Conjonctive Nez Bucco-lingual Gorge
 Gorge, aspect : érythémateux pultacé ulcéro-nécrotique pseudo-membraneux vésiculeux
- Traitement antibiotique / antiseptique en cours Oui, lequel : _____ Non
 Depuis : _____
- Contrôle après traitement antibiotique / antiseptique Oui, date d'arrêt : _____ Non



Renseignements cliniques

- Présence de symptômes ? Fièvre Douleur Ganglions Conjonctivite
 Rhinopharyngite Autre : _____

Identité du patient

Nom : _____ Nom de jeune fille : _____
 Prénom : _____ Né(e) le : / /
 Adresse : _____ Tel : _____

Correspondant (cachet)

écouvillons			Cadre réservé au labo	Résultat : <input type="checkbox"/> Labo <input type="checkbox"/> Poste <input type="checkbox"/> Pharmacie <input type="checkbox"/> E-mail _____ @ _____
		Écouvillon plus fin si nécessaire	Heure de réception : Vérfié par : <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> NC	