

« La biologie de proximité à dimension humaine »

- Les **dosages BNP et NT-Pro-BNP** ont les mêmes valeurs diagnostiques et pronostiques dans le cadre de l'insuffisance cardiaque.
Les patients sous Entresto nécessitent un suivi par NT-Pro-BNP, cette molécule est de plus en plus prescrite. Dorénavant le laboratoire réalise les dosages du BNP et du NT-Pro-BNP quotidiennement. Ces deux examens ne sont pas cumulables.
- La **prise en charge de la vitamine D** par l'assurance maladie est limitée uniquement à 6 indications (CPAM 2024) :
 - Rachitisme
 - Ostéomalacie
 - Ostéoporose
 - Personnes âgées victimes de chutes répétées
 - Suivi de transplanté rénal
 - Traitement chirurgical de l'obésité chez l'adulte (chirurgie bariatrique)
- En application de *l'arrêté du 15 mai 2018* fixant les conditions de réalisation des examens de biologie médicale d'immunohématologie érythrocytaire, Audolys Biologie **ne délivrera plus de « carte de groupe sanguin »**.
Désormais, le compte rendu de laboratoire fait office de support (papier ou dématérialisé) au résultat de groupe sanguin.
- Selon les recommandations de *l'HAS 2007*, dans le cadre de **suspicion de Polyarthrite rhumatoïde**, le bilan biologique en 1^{ère} intention pour le diagnostic positif, repose sur :
 - Facteur rhumatoïde
 - Anticorps anti-CCP
 - Vitesse de sédimentation
 - Protéine C réactive (CRP)
- Selon les dernières recommandations de *l'HAS 2023*, dans le cadre d'un dépistage ou d'un suivi de la maladie rénale chronique, diabète type II, Hypertension artérielle, traitement néphrotoxique et patients à risque, le dosage de l'albuminurie est à privilégier par rapport à celui de la protéinurie.
- Dans le cadre d'IST (CPAM 2024), hormis les sérologies HIV-BW, Hépatite B et C, les recherches **chlamydiae/ gonocoques par PCR** sont nettement plus informelles et donc à privilégier (par rapport aux sérologies).
D'autre part devant le caractère pathogène non démontré de *Mycoplasma Hominis* et *Ureaplasma urealyticum*, leurs recherches ne font plus partie de la nomenclature.
Par contre la pathogénicité de ***Mycoplasma Génitalium* est avérée et la recherche par PCR est dorénavant à la nomenclature**.
Cet examen est indiqué chez les patients symptomatiques (urétrite, cervicite aiguë) ou chez les partenaires de patients infectés.